

•••• EXERCICE 1 - ÉCRITURE MATHÉMATIQUE

Traduire avec des quantificateurs les assertions suivantes.

1. A tout réel, on peut trouver un réel qui lui soit strictement inférieur.
2. Tout réel non nul est l'inverse d'un unique réel non nul.
3. La fonction f , définie sur \mathbb{R} , n'est pas la fonction constante égale à 1.
4. Tout entier naturel est somme de quatre carrés d'entiers naturels¹.
5. Pour tout entier $n \geq 3$, l'équation $x^n + y^n = z^n$, d'inconnues x, y, z des entiers naturels non nuls, n'a aucune solution².
6. Si un réel positif est inférieur ou égal à tout autre réel strictement positif, alors il est nul.

•••• EXERCICE 2 - NÉGATION

Donner la négation de chacune des phrases ci-dessous.

1. Tous les élèves de cette classe sont des filles.
2. Il a fait beau tous les jours de la semaine.
3. Il existe une copie de dissertation de philosophie sans faute d'orthographe.

•••• EXERCICE 3 - NÉGATION

Écrire la négation de chacune des assertions suivantes.

1. $x \in [-1; 2[$
2. $\forall x \in E, x^2 \geq 5$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+1) = f(x)$ (où f est une fonction définie sur \mathbb{R})
4. $\exists T \in \mathbb{R}_*^+ / \forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)$ (où f est une fonction définie sur \mathbb{R})
5. $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq 10 \implies u_n \geq 10^4)$ (où (u_n) est une suite définie sur \mathbb{N})
6. $\exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, 4 \leq u_n \leq 5$ (où (u_n) est une suite définie sur \mathbb{N})
7. $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, -\varepsilon \leq u_n \leq \varepsilon$ (où (u_n) est une suite définie sur \mathbb{N})
8. $\exists \ell \in \mathbb{R} / \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / \forall x \in \mathbb{R}, (x \in [-\delta, \delta] \implies \ell - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell + \varepsilon)$ (où f est une fonction définie sur \mathbb{R})

•••• EXERCICE 4

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $n^2 + n$ est pair.
2. Proposer une autre démonstration de ce résultat.

•••• EXERCICE 5 - RÉCURRENCE & TERME GÉNÉRAL

1. Considérons (u_n) la suite définie sur \mathbb{N} par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 2n + 1 \end{cases}$$

Démontrer que pour tout entier naturel n , $u_n = n^2 + 1$.

2. Considérons (u_n) la suite définie sur \mathbb{N}^* par :

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2 \end{cases}$$

Démontrons que pour tout entier naturel non nul n , $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 4$.

3. Considérons (u_n) la suite définie sur \mathbb{N} par :

$$\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n \end{cases}$$

Démontrons que pour tout entier naturel n , $u_n = (n+1) \times 3^n$.

1. Ce théorème a été conjecturé par Claude-Gaspard Bachet de Méziriac (1581-1638, français) en 1621, mais c'est Joseph-Louis Lagrange (1736-1813, né italien, naturalisé français) qui le démontra en 1770. Aujourd'hui il porte le nom de théorème des 4 carrés de Lagrange.

2. Bien que Pierre de Fermat (16.-1665, français) indiqua, dans la marge de l'Arithmetica de Diophante, en avoir trouvé "une démonstration véritablement merveilleuse que cette marge est trop étroite pour contenir", il a fallu attendre 1995 et les travaux d'Andrew Wiles pour que cet énoncé soit prouvé.

•••• EXERCICE 6 - INÉGALITÉ DE BERNOULLI³

Démontrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^+, (1+x)^n \geq 1+nx$$

•••• EXERCICE 7 - DISJONCTION DE CAS

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{n(n+1)}{2}$ est un entier.

•••• EXERCICE 8 - IRRATIONALITÉ DE $\sqrt{2}$

Démontrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

•••• EXERCICE 9

Soient x_0, x_1, x_2 trois réels de l'intervalle $[0; 1]$ tels que : $x_0 \leq x_1 \leq x_2$.

Montrer qu'au moins une des quantités $x_1 - x_0$ et $x_2 - x_1$ est inférieure ou égale à $\frac{1}{2}$.

•••• EXERCICE 10 - ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Résoudre, dans \mathbb{R} , les équations et inéquations suivantes :

1. $x^2 \geq 5$
2. $-(x+3)^2 \geq -4$
3. $x^2 > x$
4. $\frac{x+2}{-x+3} \geq 0$
5. $\frac{x+2}{x-3} \geq 1$
6. $\sqrt{x+2} = x$
7. $\sqrt{2x+3} = x-6$
8. $\frac{-1}{2}x+1 \leq \sqrt{x^2-x-2}$

•••• EXERCICE 11

Démontrer :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_*^+, \sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

•••• EXERCICE 12

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer :

$$(\forall n \in \mathbb{N}, a2^n + b3^n = a) \iff a = b = 0$$

•••• EXERCICE 13 - ÉQUIVALENCE ?

1. Démontrer que pour tous $a, b, c, d \in \mathbb{R}$: $(a \leq b \text{ ET } c \leq d) \implies a + c \leq b + d$.
2. L'implication réciproque est-elle également valable pour tous réels a, b, c, d ?
3. Que penser de l'affirmation suivante : $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, (a + c \leq b + d \implies (a \leq b \text{ OU } c \leq d))$.

•••• EXERCICE 14 - NUL ?

Soit $a \in \mathbb{R}^+$. Montrer que :

$$(\forall \varepsilon > 0, a \leq \varepsilon) \iff a = 0$$

•••• EXERCICE 15 - ÉQUATION FONCTIONNELLE

Démontrer que la fonction identité est la seule fonction f définie sur \mathbb{R} et vérifiant :

- f est strictement croissante sur \mathbb{R} ,
- pour tout réel x , $f(f(x)) = x$

•••• EXERCICE 16 - ÉQUATIONS FONCTIONNELLES

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Déterminer toutes les fonctions f définies sur \mathbb{R} telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + xf(1-x) = 1+x$$

2. Déterminer toutes les fonctions f définies sur \mathbb{R} telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(y-f(x)) = 2-x-y$$

3. Déterminer toutes les fonctions f définies sur \mathbb{R} telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x)f(y) - f(xy) = x+y$$

3. Lequel ? Ici, c'est Jakob Bernoulli (1654-1705, suisse). Il est le frère de Johann et l'oncle de Daniel, Nicolas I, Nicolas II et Johann II, grand-oncle de Johann III et Jakob II, tous des Bernoulli, tous mathématiciens ! Les réunions de famille devaient être productives...